

Anwendung der Heparin-Sicherheitsfertigspritze von Sanofi

INJEKTIONSANLEITUNG FÜR PATIENTEN

Ihr Arzt hat Ihnen ein niedermolekulares Heparin verordnet.

- Damit soll entweder eine Thrombose oder Lungenembolie verhindert oder ein bestehendes Gerinnsel aufgelöst werden.
- Sie können sich die Spritze selbst geben oder Sie fragen eine Person Ihres Vertrauens.

So gehen Sie vor – einfache Schritte für eine sichere Injektion

EINFACHE VORBEREITUNG



- Suchen Sie sich eine Stelle auf der rechten oder linken Seite Ihres Bauchs aus. Diese sollte in mindestens 5 cm Entfernung seitlich von Ihrem Bauchnabel liegen.
- Waschen Sie Ihre Hände. Reinigen Sie die geplante Einstichstelle mit einem Alkoholtupfer oder mit Wasser und Seife.



- Nehmen Sie die Spritze und entfernen Sie die Schutzkappe.
- Den Tropfen auf der Nadelspitze bitte nicht abstreifen, sondern gegebenenfalls nur abschütteln!
- Die Luftblase in der Fertigspritze darf nicht entfernt werden!



- Bilden Sie an der gereinigten Stelle zwischen Daumen und Zeigefinger eine Hautfalte, die Sie bis zum Herausziehen der Injektionsnadel halten.

EINFACHE INJEKTION



- Führen Sie die Nadel senkrecht in einem Winkel von 90° ein, drücken Sie den Spritzenstempel vorsichtig nach unten und injizieren Sie den gesamten Inhalt der Spritze (bitte beachten Sie gegebenenfalls davon abweichende Dosierangaben Ihres Arztes). Die Hautfalte darf nicht gelockert werden.
- Wichtig ist, dass Sie den Spritzenstempel vollständig eindrücken, damit der Schutzmechanismus aktiviert wird.



- Zählen Sie langsam bis 5, danach ziehen Sie die Nadel langsam heraus.
- Die Schutzhülle schiebt sich über die Nadel und schließt diese ein.



- Die verwendete Spritze kann nun in einem durchstichsicheren Abfallbehälter, wie z.B. in einem alltäglich verfügbaren leeren Gefäß, entsorgt werden.

Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Inject App!

